

Bestimmungsschlüssel für Lurche im Stadtgebiet Regensburg

Mit dieser Bestimmungshilfe gelingt Ihnen in wenigen Schritten die Bestimmung der in Regensburg vorkommenden Lurche.

- | | |
|--|-----------------------------|
| (1) - erwachsenes Tier mit seitlich zusammengedrücktem Schwanz | → (2) Molche |
| - erwachsenes Tier ohne Schwanz | → (3) Frösche, Kröten Unken |
| (2) - Oberseite bräunlich, Kopfseiten mit einem durch das Auge ziehenden Längsstreifen, Bauch mit Flecken | → Teichmolch |
| - Oberseite blauschwarz, Kopfseiten ohne dunkle Längsstreifen, Bauch ohne Flecken | → Bergmolch |
| (3) - Haut warzig | → (4) Kröten, Unken |
| - Haut glatt | → (6) Frösche |
| (4) - Bauchseite auffallend gelb-schwarz gefärbt, Pupillen herzförmig | → Gelbbauchunke |
| - Bauchseite mehr oder weniger weiß, Pupillen ein waagrechtter Schlitz | → (5) Kröten |
| (5) - Oberseite oliv bis braun, ohne scharf begrenzte Flecken | → Erdkröte |
| - Oberseite mit scharf begrenzten, olivgrünen Flecken | → Wechselkröte |
| (6) - mit dunklem Schläfenfleck, Schwimmhäute reichen nicht bis zur Spitze der längsten Zehe, Männchen ohne Schallblase | → Grasfrosch |
| - ohne dunklen Schläfenfleck, Schwimmhäute reichen bis zur Spitze der längsten Zehe, Männchen mit zwei Schallblasen seitlich am Kopf | → Grünfrösche |